



D. O. M.  
POSITIONES ANATOMICÆ  
ET  
CHIRURGICÆ.

EX ANATOMIA,

I,



UANTAM omnibus, ob structuræ elegantiam, admirationem movere debeat Sceleſi ſpectaculum, cuius attendenti facilè obſivium eſt. Oſſa, partem ſanè haud ſpernendam, Corporis ædificio fulcimenti ergo indita duplici inter ſeſe modo, cum motù nimirum & ſine motù adunari probè obſervârunt. Anatomix Antiſtiſites. Ne autem ex duplici illâ adunatione prolixi nonnihil enaſceretur; ſuam utraque fortita eſt denominationem: prior nempe Arthron, poſterior verò Symphyſeos nomine inſignitur.



## I I.

Ex Ossibus porro motū gaudentibus, evidenter alia; alia obscure moventur: hincque bina effluxit Articulationis species; Diarthrosis videlicet & Syntarthrosis; quæ quidem ut iterum in Enarthrosim, Arthrodiam & Ginglymum dividerentur, usus invaluit; eo tamen inter ipsas notato discrimine, quod in hæc vix appareant motus in illâ maximè conspicui.

## I I I.

SYMPHYSIS, altera junctionis Ossium species, cum medio & sine medio considerata occurrit; ac utroque sub respectu multiplices veluti in ramos distinguitur: alia quippè futuram, Harmoniam, & Gomphosim; alia verò Synevrosim, Synchondrosim; & Syssarcosim complectitur.

## I V.

NULLUS sanè foret proponendi exitus, nulla circumscriptio; si quotquot recensentur Articulationum propagines, omnes & singulas ad amissim evolvendas susciperemus. Quapropter brevitati consulentes, sermonem aliò conferre juvat. De Femoris cum Tibiâ junctione, quantum ad hujus-ce partis Ankylosim spectat, eo loci sumus duntaxat disputaturi.

## V.

PLURIMIS ergo constare partibus cartilagineis, ligamentosis, aponevroticis &c. Rotulæ, nec non Femoris cum Tibiâ Articulationem nostris fusiùs patebit responsis.

## E X C H I R U R G I A.

## I.

AFFECTUM amissio vel debilitatio Articulationis cujuscumque motū oriundum. Ankylosim vocant: exindè que manat duplex Ankylosis distinguenda; aliam divèrè perfectam, seu completam; aliam autem imperfectam, seu incompletam nuncupant. His planè vocibus allonant vera & falsa.

## I I.

INTERNAS esse & externas Ankylosis causas nemo Artipertitus diffidet. Priores ex vitiatò, quolibet de causâ, Humore

sinoviali, tumefactis tùm Cartilaginibus, tùm junctis simul Ossium extremitatibus, Phlegmone, Abscessû, Carie, Arthritide, &c. Posteriores ab ictû, lapsû, Ligaturâ, Compressione, Fracturâ, luxatione, &c. sunt repetendæ.

### III.

Ex movendæ Articulationis seu difficultate, seu impossibilitate hujus vel illius Ankylosis facili prorsûs negotio elucescet Diagnosis.

### IV.

LONGE verò plurima diversam ejusdem affectûs Prognosis constituant, essentia scilicet, Articulationis species, ætas, causa, Ægri habitudo, accidentia, &c.

### V.

ANKYLOSIS perfectæ curatio nec speranda, imò nec tentanda, nisi amputationis auxilio; quod quidem medium, n<sup>o</sup> gravissima faviant accidentia, improbandum censemus.

### VI.

ORTAM ex inversis Cartilaginibus, strangulatis-ve ex parte Ossium ligamentis, reductâ jam dudum luxatione, Ankylosim insanabilem judicamus.

### VII.

AT non item de symptomatibus Ankylosim perfectam comitantibus: illa enim, faventibus remediis tùm generalibus, tùm peculiaribus, prout casus tulerit, Chirurgi extirpabit sagacitas.

### VIII.

HAUD unus est Ankylosis imperfectæ curationis scopus: spissato quippè ultra modum Humore sinoviali, deficiente eodem, aut copiosius in Articulum affluente, immutato-ve propter peculiaria vitia naturali statû, varia pro vario casû vel interna, vel externa admovebuntur medicamenta.

### IX.

UBI nimia adest humbris sinovialis spissitudo frictiones calefactis cum linteis, aquarum ex alto aspersiones, Baredginæ, Borboniæ, Granenses, diluentia, emollientia cataplasmata, quodque non levis est momenti, plus minûs-ve repetiti Articulationis motus felici ut plurimum successû adhibentur. Cùm autem ex

4

ipſius - met Sinoviæ defectû aut penuriâ procreatur Ankiſiſ ;  
potus diluentes , & amaroſ , ſanguiniſ miſſioneſ , ba'nea , mino-  
rativa , frictioneſ ſuprà laudatoſ , & repetitoſ aquarum ex edito  
Aſperſioneſ in uſum vocari expedit. Affluente demûm majori  
Sinoviæ copiâ , ad reſolventia , prædictoſ partiſ motuſ , purgantia ,  
venarum ſectioſ ſæpè ſæpiuſ iteratoſ & imprimiſ tenuem victûſ  
rationem confugiendum.

X

Si fortè diſſuſo per Articulationem , ob fracturam , ſucco Oſſiſ  
nutricio , immineat Ankiſiſ , huic , apparatû congruo , motibuſ-  
que interdûm adhibitoſ occurrere pronuſ eſt : quæ tamen media ſi  
proſperè minùſ ceſſerint , iſſdem certè incœpta debellabitur.

X I.

SUPERVENIENTE Abſceſſû , Punctioſ in partibuſ Arti-  
culi lateralibuſ , aut potiùſ Inciſioneſ inſtituendæ ſunt , apparatûſ-  
que , pro re natâ , idoneuſ apponenduſ.

*Haſ poſitioneſ , DEO JUVANTE & Præſide M. FRAN-  
CISCO-MICHAELE DISDIER , Artiũ Liberaliũ  
& Chirurgiæ Magiſtro , tueri conabitur JOANNES-BERTRAN-  
DUS SOUQUE , Convenenſiſ , Artiũ Liberaliũ Magiſter ,*

P A R I S I I S ,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS:

*Die Sabbati 17<sup>a</sup> Februarii , à ſeſqui-ſecundâ poſt meridiem  
ad Septimam. Anno Domini 1753.*

P R O A C T U P U B L I C O ,

E T

MAGISTERII LAUREA:

---

Typiſ DELAGUETTE Regii Chirurg. Collegii  
Typographi. 1753.